



TOBINARO

Info zaadfirma	Teeltinfo van de zaadfirma.
Vruchtgewicht	150 à 190 gram
Los of tros	los
Stengeldichtheid	Belicht: start 2,7 stengels/m ² Onbelicht: start 2,25 naar 2,5 stengels/m ²
Eindafstand	2,5 à 3,0 stengels/m ²
Trossnoei	5 à 6
Onderstam	Maxifort of DRO141
	Toppen op 2 ^{de} blad
Teeltgebied	België

RASBESCHRIJVING:

De meeste teelten starten met getopt geënte planten (getopt op 2^{de} blad). De scheuten komen beiden vrij goed door. Het aantal potten per m² bij de plantenkweker is belangrijk. Als de planten te nauw staan, kan er rek op de planten komen, die moeilijk te stoppen is. Op dat moment wordt de trossaanleg zwakker. Conclusie, net zoals veel rassen, is Tobinaro zeer lichtgevoelig.

Tobinaro ontwikkelt vrij snel een stevige stamdikte. Tobinaro op een sterke onderstam DRO141 kan zich vegetatief ontwikkelen. Bij deze combinatie zal de watergift “generatief” moeten zijn, om de plantbalans richting tros te sturen. Tijdens de dag is een stevige buistemperatuur en luchting noodzakelijk om de verdamping te stimuleren.

Het aantal bloemen per tros is eerder hoog, ±/- 6 à 7 en meer. Bij de minste verstoring van het evenwicht ontstaan er kleinere trossen (minder bloemaanleg). Een voornacht (± 15°C) helpt om het aantal bloemen per tros op niveau te houden. Indien goed gesnoeid, dan zal er steeds voldoende bloem zijn.

De ruime kopafstanden impliceren dat de nachten niet “te” koud moeten zijn. Het gewas is tijdens de aanvangsfase teelt, eerder “vol”. Het wordt aangeraden vanaf trosbloei 3 een blaadje uit de kop te verwijderen. Voor plantingen van 15/1 zal dit eerder vanaf trosbloei 1 zijn om het volle, vegetatieve af te leiden naar de trosontwikkeling.



Tijdens de zomer kan het gewas “opener” worden. Vanaf begin mei tot eind juni wordt minder blad uit de kop weggenomen. Eenmaal de dagen korter worden, wordt is het terug belangrijk blad uit de kop te verwijderen.

Tobinara is iets bleker qua gewaskleur dan zijn voorganger Mattinara. Tobinara is iets vegetatiever, iets voller dan Mattinara. Het vruchtgewicht kan iets lager zijn dan Mattinara. Er zijn weinig misvormde vruchten.

ZWAKKE/STERKE PUNTEN:

- Gevoelig voor Macrolophus (Nesidiocorus) prikschade.
- Gevoelig voor wankleurig, bij start/ einde van de teelt.
- Niet gevoelig voor neusrot.

TEELTTIPS:

- Gewas vraagt veel energie, zeker in de aanvangsfase van de teelt. Goed door beheersen, ook na het op de mat gaan, is belangrijk voor de trossen.
- Een stevige beheersing (tot bloei op de 2^e tros) zorgt voor merkkelijk sterkere trossen en een hoger vruchtgewicht.
- De trossen gezet in december (onbelicht) worden op 2 à 3 gesnoeid, januari zetting op 4 stuks, vanaf februari 5 stuks per tros. In aanloop naar de lichtste periode van het jaar, wordt bij de ruime kopafstanden een aantal trossen op 6 gesnoeid (10 april tot 10 juni). In de onbelichte teelten worden de trossen ondersteund, minstens tot aan de oogst (8 à 10 trossen schrapen of beugelen).
- Bij belichte teelten worden de 1^{ste} trossen op 4 gesnoeid, daarna jaarrond 5 à 6
- De doorkleuring vraagt aandacht. Een goed evenwicht in het gewas (aantal stuks, plantbelasting tov gewas) voorkomt de meeste problemen. De meeste bedrijven doseren een vrij hoge kali/calcium gift (10/6 mmol/liter).
- Na het toppen moet er vlot blad worden weggehaald, aangezien het blad zeer groot kan worden waardoor er te weinig licht op de vruchten valt en de doorkleuring bemoeilijkt wordt. In de aanloop naar het rijp maken is extra doseren van kalisulfaat en minder calciumnitraat aan te raden.
- De eerste 10 trossen alsook de laatste 7 trossen moet gebeugeld/ondersteund worden.

Februari 2024 Lycopersicon.